

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizarlo con cuidado para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días, debe consultar a un médico.

En este prospecto se explica:

- 1 - **QUE ES ODAMIDA Y PARA QUE SE UTILIZA**
- 2 - **ANTES DE UTILIZAR ODAMIDA**
- 3 - **COMO UTILIZAR ODAMIDA**
- 4 - **POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**
- 5 - **CONSERVACION DE ODAMIDA**

ODAMIDA solución para enjuague bucal

Composición por 100 ml

Los principios activos son:

Cloruro de Benzalconio 100 mg

Cloruro de Zinc 250 mg

Los excipientes son:

Aromas de anís, canela, clavo, menta. Mentol, timol, salicilato de metilo, benjuí, vainillina, ác. cítrico, sacarina, amaranto (E-123), etanol 48,8% v/v, agua purificada.

LABORATORIO TITULAR Y FABRICANTE:

Laboratorio Químico Biológico Pelayo, S.A.

Tallers, 16 - 08001 Barcelona



1 - QUE ES ODAMIDA Y PARA QUE SE UTILIZA

ODAMIDA solución para enjuague bucal, frasco con 135 ml, contiene cloruro de Benzalconio que presenta una acción bactericida sobre gérmenes gram-positivos que se han encontrado en la cavidad bucal y cloruro de Zinc que presenta una acción astringente y desodorante sobre la cavidad bucal.

Este medicamento *se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves de la boca*, tales como aftas. También se emplea *para corregir el mal aliento*.

2 - ANTES DE UTILIZAR ODAMIDA

No utilice ODAMIDA:

En niños menores de 12 años.

No poner en contacto con los oídos por ser ototóxico el cloruro de Benzalconio.

En caso de hipersensibilidad o alergia a cualquiera de sus componentes.

NO INGERIR

Tenga especial cuidado:

Consultar al médico si los síntomas persisten más de 5 días o se agravan, o aparece fiebre u otros síntomas.

Debe aclararse bien la boca antes de utilizar este producto después de utilizar pasta de dientes, porque los jabones y surfactantes aniónicos inactivan el preparado.

No sobrepasar las dosis indicadas en la posología.

Las aplicaciones más frecuentes pueden producir irritación.

Embarazo: Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Lactancia: Las mujeres en período de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Uso en otros medicamentos: Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3 - COMO UTILIZAR ODAMIDA

ODAMIDA se utiliza sólo como enjuague bucal o en toques.

Adultos y niños mayores de 12 años: Puede ser utilizado directamente en forma de “toques” o bien diluída en forma de “enjuagues”. *Máximo 4 veces al día.* Utilizar siempre con la boca perfectamente aclarada en el caso de que se haya utilizado pasta de dientes.

Siga estas **instrucciones** a menos que su médico le haya dado otras instrucciones distintas:

- **En forma de “toque”** con ODAMIDA solución pura, mediante un algodón empapado y enroscado en un palillo, en caso de aftas.
- **Diluída:** mezclando en un vaso, aproximadamente medio tapón del frasco con ODAMIDA solución y 2 tapones llenos de agua. A continuación efectuar “enjuagues”.

Si estima que la acción de ODAMIDA es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

En caso de **ingestión** del contenido de un frasco de ODAMIDA, que contiene 66,8 ml de etanol, puede producirse irritación estomacal con náuseas y vómitos. Acudir inmediatamente a un centro de urgencias con el prospecto o frasco, o llamar al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

4 - POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Un frasco de ODAMIDA contiene 66,8 ml de alcohol etílico.

Como todos los medicamentos puede tener efectos adversos.

Algunos pacientes pueden desarrollar hipersensibilidad tras repetidas aplicaciones.

Si se observa ésta o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte a un médico o farmacéutico.

5 - CONSERVACION ODAMIDA

Mantener el envase perfectamente cerrado.

No se precisan condiciones especiales.

No utilizar ODAMIDA después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

MANTENGA ODAMIDA FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.

Sin receta médica

Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. de esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.